

- VARIANTE 3: - pone un altro boccuccino a 60 cm di distanza e ripetere "bravo"
- (per soggetti con problemi nella fase del riaggancio, mancanza di fiducia nel PO)
- elizievoci lentamente dando le spalle al cane e allattandolo.
  - dopo qualche metro → ripetere, in ginocchio, avvicinando il boccuccino
  - se lo masio di "non fiducia" inizia a ridursi, oltre al "bravo" allunghiamo una mano nel tentativo di accarezzarlo
  - quando c'è maggior fiducia → offriamo il cane per la pettonina, tirare fuori il guinzaglio e riagganciare.

- ANEGUATEZZA: - per cani con arousal alto prolungiamo la fase di sgancio → esplorazione dello masio circostante; ricerca oggettiva al guinzaglio; CNV composta e poco cinetica. Quando si è calmato e ci guarda, premiamo e sganciamo
- se il cane scatta e si sottrae al riaggancio → prolungiamo la fase dell'allattamento e del ridursi
  - se grande fiducia verso il PO → posture particolari per incuriosire il cane → in ginocchio, seduti e terra, sdraiati supini/proni

- PROPEDEUTICITÀ: - esercizi base su focalizzazione e direzionamento
- centripetazione in movimento
  - turning
  - gestione delle attenzioni
  - palestra con il corpo

- ETÀ EVOLUTIVA: - dai 2 mesi  $\frac{1}{2}$  / 3 mesi (il cucciolo non si allattava mai molto)
- la fase sensibile va dai 3 ai 6 mesi (cucciolo-cucciolo)